

BHV-1 Untersuchungsintervalle ab 2026

(Stand 03/26)



Milchviehbetriebe
(≥ 30% laktierende Milchkühe)

Ammen-/Mutterkuhhaltungen
(unabhängig vom Kuhanteil)

Betriebe < 30% Kuhanteil

männliche Zuchttiere -
Einsatz auf unterschiedlichen
Betrieben

Einzelmilch oder Sammelmilch

oder
Blut (Serum)

2x jährlich (alle 5-7 Monate)
alle laktierenden Kühe

1x jährlich
alle Rinder > 24 Monate

Blut (Serum)
(oder Einzelmilch)

alle 2 Jahre
**Stichprobe
aller Rinder > 24 Monate**

Fresseraufzuchtbetriebe

Blut (Serum)

Aufzucht aus Zukauf
2x jährlich
Stichprobe (bevorzugt > 6 Mon.)

ausschließlich eigene Aufzucht
1x jährlich
Stichprobe (bevorzugt > 6 Mon.)

Endmastbetriebe

keine Untersuchung

ausschließlich + unmittelbar zur
Schlachtung
kein Kontakt zu anderen Rindern

Mastbetriebe

Blut (Serum)

alle 2 Jahre
**Stichprobe
aller Rinder > 6 Monate**

extensive Haltung
(andere Boviden)

Blut (Serum)

Intervall nach Risikoeinschätzung
**Stichprobe/bei Handling
alle Rinder > 24 Monate**

Färsenaufzucht oder andere nicht
aufgeführte Nutzungsformen
≠ Mast

Blut (Serum)
oder Einzelmilch

1x jährlich
alle Rinder > 6 Monate

Blut (Serum)

alle 6 Monate

Stichprobenschlüssel:

Anzahl gehaltener Rinder	Anzahl Tiere (Stichprobenumfang)
1 – 30	alle
31 – 40	31
41 – 60	38
61 – 100	45
> 100	59